

Тесты для промежуточной аттестации

студентов лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического и фармацевтического факультетов, факультета иностранных студентов, интернов

Квалификационные тесты включают в себя вопросы по сестринскому делу, неотложной помощи и реанимации, медицине катастроф и оказанию помощи детскому населению. Содержание тестов соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».

Выберите один правильный ответ

1. Колибактерин предназначен для введения

- а) внутривенного
- б) подкожного
- в) перорального
- г) внутримышечного

2. Вакцину БЦЖ с целью иммунизации вводят

- а) внутримышечно
- б) внутримышечно или подкожно
- в) строго подкожно
- г) строго внутрикожно

3. В раннем послеоперационном периоде после полостной гинекологической операции задача медицинской сестры

- а) напоить больную горячим сладким чаем
- б) накормить больную
- в) следить за гемодинамикой и состоянием послеоперационного шва
- г) дать обезболивающие таблетки, по просьбе больной

4. Больного после спинномозговой пункции необходимо уложить

- а) на живот без подушки
- б) на спину с приподнятым головным концом
- в) на бок с приведенными к животу коленями
- г) полусидя

5. Кристаллоидные растворы перед внутривенным введением

- а) подогревают до комнатной температуры
- б) подогревают до 50⁰
- в) подогревают до 37-38⁰
- г) вводят холодными в случае гипертермии

6. Больному брюшным тифом при задержке стула показано

- а) пища с обилием клетчатки
- б) солевые слабительные
- в) массаж живота
- г) небольшая очистительная клизма

7. Укушенные раны, нанесенные животными (возможными источниками бешенства), необходимо

- а) обработать йодом
- б) промыть перекисью водорода
- в) промыть раствором фурацилина
- г) промыть мыльным раствором

8. Метод А.М. Безредко предусматривает

- а) прием суточной дозы лекарств на фоне антигистаминных препаратов
- б) введение препаратов в минимальных дозировках

- в) введение вначале небольшой дозы препарата, а при отсутствии реакции – полной дозы
- г) введение суточной дозы препаратов с максимально большими интервалами

9. Максимальный объем препаратов, вводимый внутримышечно в одно место, не превышает

- а) 5 мл
- б) 10 мл
- в) 15 мл
- г) 20 мл

10. Наблюдение за пациентом после постановки пробы на переносимость антибиотиков продолжается

- а) в течение 2-3 минут
- б) в течение 5-10 минут
- в) до 30 минут
- г) не менее 2 часов

11. Неотложная помощь при анафилактическом шоке начинает оказываться

- а) в процедурном кабинете
- б) в отделении реанимации
- в) в палате интенсивной терапии
- г) на месте развития

12. При анафилактическом шоке, вызванном внутривенным капельным введением лекарств, главным является

- а) снять капельницу
- б) перекрыть капельницу, сохранив доступ в вену
- в) создание психического покоя
- г) пероральный прием антигистаминных препаратов

13. Сонная артерия при кровотечении из нее прижимается к

- а) углу нижней челюсти
- б) поперечному отростку 7-го шейного позвонка
- в) к ключице
- г) к грудино-ключично-сосцевидной мышце

14. При применении сердечных гликозидов следует следить за:

- а) температурой тела
- б) частотой пульса
- в) цветом мочи
- г) сном

15. Струйно можно вводить

- а) компоненты крови
- б) реополиглюкин
- в) гемодез
- г) трисоль

16. Ферментативные препараты (мезим, фестал) принимают

- а) независимо от приема пищи
- б) строго натощак
- в) во время еды
- г) спустя 2-3 часа после еды

17. Резкое падение температуры, тахикардия, бледность кожных покровов при брюшном тифе могут свидетельствовать о

- а) начале выздоровления
- б) кишечном кровотечении

- в) сниженном иммунитете
- г) гиповитаминозе

18. Резкий запах озона в воздухе после кварцевания свидетельствует о

- а) надежном обеззараживании воздуха
- б) создании благоприятной атмосферы для человека
- в) недостаточном времени для обеззараживания воздуха
- г) необходимости проветривания помещения и плохой работе бактерицидной лампы

19. Органы дыхания необязательно защищать маской при

- а) взятии крови из вены
- б) взятии мазка из зева и носа
- в) уходе за больным холерой
- г) приготовлении растворов хлорамина

20. С целью улучшения кровообращения при бронхолегочных заболеваниях детям противопоказано

- а) ставить горчичники
- б) ставить банки
- в) делать массаж
- г) делать согревающий компресс

21. Ветошь для генеральной уборки операционной должна быть

- а) любой
- б) чистой
- в) продезинфицированной
- г) стерильной

22. Инсулин хранят

- а) при комнатной температуре
- б) при температуре $+1 \text{ } ^\circ\text{C}$
- в) при $-1 \text{ } ^\circ\text{C}$
- г) в замороженном виде

23. Вид транспортировки определяет

- а) медицинская сестра в соответствии с состоянием больного
- б) медицинская сестра в соответствии с самочувствием больного
- в) врач в соответствии с самочувствием больного
- г) врач в соответствии с состоянием больного

24. При транспортировке больного в кресле-качалке представляет опасность нахождение рук

- а) на животе
- б) в скрещенном положении
- в) на подлокотниках
- г) за пределами подлокотников

25. При критическом падении температуры не следует

- а) сообщать о случившемся врачу
- б) убирать подушку из-под головы и приподнимать ноги пациента
- в) оставлять одного пациента для создания максимального покоя
- г) давать пациенту горячий чай

26. Техника безопасности при хранении баллонов с кислородом предусматривает все, кроме

- а) запрета курения в помещении, где хранятся баллоны
- б) хранения баллонов вблизи источников тепла

- в) хранения баллонов в хорошо вентилируемом помещении
- г) соприкосновения кислорода с жирами и маслами

27. Взятие материала на бактериологический посев из прямой кишки запрещено проводить

- а) резиновым катетером
- б) ректальной петлей
- в) ректальным тампоном
- г) ректальной стеклянной трубкой

28. Основной признак одышки у ребенка:

- а) бледность кожных покровов
- б) раздувание и напряжение крыльев носа
- в) выбухание родничков
- г) громкий плач

29. После сублингвального приема клофелина при гипертоническом кризе пациент должен оставаться в положении лежа не менее

- а) 10-15 минут
- б) 20-30 минут
- в) 1,5-2 часов
- г) 12 часов

30. При попадании масляных растворов и суспензий в кровеносный сосуд возможно развитие

- а) эмболии
- б) флегмоны
- в) кровотечения
- г) спазма сосуда

31. При внутримышечном введении амиазины больному необходимо

- а) находиться в положении лежа 1,5-2 часа
- б) принять антигистаминные препараты
- в) положить грелку на место инъекции
- г) принять пищу

32. При появлении ярких кровавистых выделений из влагалища у беременной при сроке 10 недель необходимо

- а) направить беременную к врачу женской консультации
- б) срочно отправить беременную в стационар любым попутным транспортом
- в) вызвать скорую помощь
- г) уложить беременную дома в постель и ввести кровоостанавливающие препараты

33. Защитой от ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем, являются

- а) презервативы
- б) внутриматочные спирали
- в) гормональные контрацептивы
- г) местные контрацептивы

34. В первые сутки после родов подмывать роженицу следует

- а) на гинекологическом кресле
- б) на кушетке в процедурном кабинете
- в) в постели
- г) в туалетной комнате, обучив ее самостоятельно выполнять процедуру

35. Взятие мазков из влагалища медицинская сестра производит

- а) стерильными инструментами в стерильных перчатках
- б) стерильными инструментами без перчаток

- в) стерильными инструментами в чистых перчатках
- г) продезинфицированными инструментами в стерильных перчатках

36. Измерения АД у беременной с тяжелой формой гестоза медсестра производит

- а) в процедурном кабинете, в положении пациентки лежа
- б) на посту, в положении пациентки сидя
- в) в постели, в положении пациентки лежа
- г) в палате, в положении пациентки сидя